

先発権・特許権のある効能の承認取得状況(2020年7月29日更新)

共和製品名	先発製品名	効能・効果 (共和製品になく、先発製品にある効能)など	当社の承認取得予定年月日
アリピプラゾール内用液3mg分包, 6mg分包, 12mg分包「タカタ」	エビリファイ内用液0.1%	双極性障害における躁症状の改善	未定
アリピプラゾール錠3mg, 6mg, 12mg, 散1%「アメル」 アリピプラゾールOD錠3mg, 6mg, 12mg「アメル」 アリピプラゾール内用液3mg分包, 6mg分包, 12mg分包「タカタ」	エビリファイ錠3mg, 6mg, 12mg, 散1% エビリファイOD錠3mg, 6mg, 12mg エビリファイ内用液0.1%	うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ※エビリファイOD錠24mgは除く	未定 (特許期間:2026年8月1日まで)
		小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 ※エビリファイOD錠24mgは除く	未定 (特許期間:2026年7月16日まで)
エゼチミブ錠10mg「アメル」	ゼチーア錠10mg	ホモ接合体性システロール血症	未定 (特許期間:2022年1月25日まで)
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg, 50mg, 75mg「アメル」	デプロメール錠25, 50, 75 ルボックス錠25, 50, 75	【用法・用量】 小児への投与:強迫性障害 通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として25mgずつ行うこと。	未定 (再審査期間:2021年7月2日まで)
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg, 錠5mg「アメル」	ガスモチン錠2.5mg, 錠5mg	経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助	申請中 (特許期間:2020年9月27日まで)
リスパリドン錠0.5mg, 1mg, 2mg「アメル」、リスパリドンOD錠0.5mg, 1mg, 2mg「アメル」、細粒1%、内用液1mg/mL、内用液分包0.5mg, 1mg, 2mg「アメル」	リスパダール錠1mg, 2mg、リスパダールOD錠0.5mg, 1mg, 2mg、リスパダール細粒1%、内用液1mg/mL	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	申請中 (再審査期間:2020年2月28日まで)
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」 (販売中止)	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	骨ペーজেット病	未定 (再審査期間:2018年7月15日まで)
ロスバスタチン錠2.5mg, 5mg「アメル」 ロスバスタチンOD錠2.5mg, OD錠5mg「アメル」	クレストール錠2.5mg, 5mg クレストールOD錠2.5mg, OD錠5mg	家族性高コレステロール血症	未定 (特許期間:2021年11月16日まで)