

ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」  
ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」  
ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」  
ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」  
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」  
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」  
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」

に係る

医薬品リスク管理計画書

本資料に記載された情報に係る権利及び内容についての責任は共和薬品工業株式会社にあります。当該情報を適正使用以外の営利目的に利用することはできません。

共和薬品工業株式会社

ドネペジル塩酸塩「アメル」に係る  
医薬品リスク管理計画書（RMP）の概要

販売名	ドネペジル塩酸塩錠3mg、錠5mg、錠10mg「アメル」 ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 ドネペジル塩酸塩 OD 錠3mg、OD 錠5mg、OD 錠10mg「アメル」	有効成分	ドネペジル塩酸塩
製造販売業者	共和薬品工業株式会社	薬効分類	87119
提出年月		令和3年7月	

1.1. 安全性検討事項					
【重要な特定されたリスク】	頁	【重要な潜在的リスク】	頁	【重要な不足情報】	頁
<a href="#">徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動、失神</a>	3	<a href="#">過量投与</a>	10	<a href="#">長期投与時における安全性（レビー小体型認知症）</a>	11
<a href="#">消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血</a>	3	<a href="#">原因不明の突然死</a>	10		
<a href="#">消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）</a>	4				
<a href="#">パーキンソン症状</a>	4				
<a href="#">心筋梗塞、心不全</a>	5				
<a href="#">肝炎、肝機能障害、黄疸</a>	5				
<a href="#">脳性発作、脳出血、脳血管障害</a>	6				
<a href="#">悪性症候群</a>	6				
<a href="#">横紋筋融解症</a>	7				
<a href="#">呼吸困難</a>	7				
<a href="#">急性膵炎</a>	8				
<a href="#">急性腎障害</a>	8				
<a href="#">血小板減少</a>	9				
1.2. 有効性に関する検討事項					
<a href="#">長期投与時における有効性（レビー小体型認知症）</a>	11	<a href="#">全般臨床症状に対する有効性（レビー小体型認知症）</a>	11		

↓上記に基づく安全性監視のための活動

2. 医薬品安全性監視計画の概要	頁
<a href="#">通常の医薬品安全性監視活動</a>	12
<a href="#">追加の医薬品安全性監視活動</a>	
<a href="#">特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</a>	12
<a href="#">製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</a>	13
3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要	頁
<a href="#">特性使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</a>	13
<a href="#">製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</a>	13

↓上記に基づくリスク最小化のための活動

4. リスク最小化計画の概要	頁
<a href="#">通常のリスク最小化活動</a>	14
<a href="#">追加のリスク最小化活動</a>	
<a href="#">医療従事者向け資材（適正使用ガイド、情報提供資材（診断基準））の提供</a>	14
<a href="#">患者及び患者の家族向けパンフレットの作成と提供</a>	14

各項目の内容は RMP の本文でご確認下さい。

医薬品リスク管理計画書

令和3年7月9日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

住所：大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号

氏名：共和薬品工業株式会社

代表取締役社長 角田 礼昭

標記について次のとおり提出します。

品目の概要			
承認年月日	①②④⑤⑥ 2011年7月15日 ③⑦ 2013年8月15日	薬効分類	87119
再審査期間	該当なし	承認番号	①22300AMX00991000 ②22300AMX00992000 ③22500AMX01459000 ④22300AMX00831000 ⑤22300AMX00829000 ⑥22300AMX00830000 ⑦22500AMX01438000
国際誕生日	1996年11月25日		
販売名	①ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」 ②ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 ③ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」 ④ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 ⑤ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 ⑥ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 ⑦ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」		
有効成分	ドネペジル塩酸塩		
含量及び剤型	①～③ 1錠中にドネペジル塩酸塩3mg、5mg又は10mgを含有するフィルムコーティング錠 ④1g中にドネペジル塩酸塩5mgを含有する細粒剤 ⑤～⑦ 1錠中にドネペジル塩酸塩3mg、5mg又は10mgを含有する口腔内崩壊錠		
用法及び用量	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。 なお、症状により適宜減量する。		

	レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する。5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により5mgまで減量できる。
効能又は効果	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
承認条件	レビー小体型認知症を対象に、本剤の有効性の検証及び安全性の確認を目的とした臨床試験を実施し、終了後速やかに試験成績及び解析結果を提出すること。
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>「先発医薬品アリセプト錠3mg」、「先発医薬品アリセプト錠5mg」、「先発医薬品アリセプト錠10mg」、「先発医薬品アリセプト細粒0.5%」、「先発医薬品アリセプトD錠3mg」、「先発医薬品アリセプトD錠5mg」及び「先発医薬品アリセプトD錠10mg」に対する後発医薬品</li> <li>効能追加 アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制（下線部追加）： 2019年3月27日承認取得</li> </ul>

変更の履歴	
前回提出日	令和3年3月9日
変更内容の概要：	軽微変更のため公表内容に変更なし
変更理由：	

1. 医薬品リスク管理計画の概要

1. 1 安全性検討事項

重要な特定されたリスク	
徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT 延長、心室頻拍 (torsades de pointes を含む)、心室細動、失神	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由： 先発医薬品の国内製造販売後においても報告が集積されており、本剤の薬理作用からも発症が予測され、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</p>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p>【選択理由】 レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「慎重投与」、「重要な基本的注意」及び「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p>【選択理由】 徐脈性不整脈及び頻脈性不整脈に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由： 先発医薬品の国内製造販売後においても報告が集積されており、本剤の薬理作用からも発症が予測され、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</p>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p>【選択理由】 レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「慎重投与」及び「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を</li> </ul>

	<p>実施する。</p> <p><b>【選択理由】</b> 消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔及び消化管出血に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
<p>消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）</p>	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の国内製造販売後において報告が集積されており、本剤の薬理作用からも高頻度での発症が予測されるため。</li> </ul>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「用法・用量」に漸増投与を設定し、「用法・用量に関する使用上の注意」及び「その他の副作用」の項に、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供</li> <li>2. 患者及び患者の家族向けパンフレットの作成、提供</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
<p>パーキンソン症状</p>	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本剤の薬理作用から、日常生活動作が制限される、あるいは薬物治療を要する程度のパーキンソン症状を有する患者への投与では特に注意が必要であり、これらの症状が発現した場合には、投与中止や減量等の適切な処置が必要であることから設定した。</li> </ul>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況、発現に影響を与える要因を詳細に把握するため。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、添付文書の「慎重投与」、「重要な基本的注意」及び「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供</li> <li>2. 患者及び患者の家族向けパンフレットの作成、提供</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> パーキンソン症状に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
心筋梗塞、心不全	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現時場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 心筋梗塞及び心不全に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
肝炎、肝機能障害、黄疸	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現時場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p>

	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>肝炎、肝機能障害及び黄疸に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
脳性発作、脳出血、脳血管障害	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>脳性発作、脳出血及び脳血管障害に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
悪性症候群	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p>



	<p>自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における悪性症候群の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：  <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b>  悪性症候群に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
横紋筋融解症	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> </p> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：  <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b>  自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における横紋筋融解症の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：  <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b>  横紋筋融解症に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
呼吸困難	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> </p> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：  <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。</li> </ul>

	<p>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用） 2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</p> <p><b>【選択理由】</b> 自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における呼吸困難の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由： <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「慎重投与」及び「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 呼吸困難に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
急性肺炎	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由： ・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</p> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常 of 医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における急性肺炎の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由： <b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 急性肺炎に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
急性腎障害	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由： ・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</p>

	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における急性腎障害の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p> <hr/> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>急性腎不全に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>
血小板減少	
	<p>重要な特定されたリスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の自発報告において報告が集積されており、発現した場合に重篤な転帰を辿ると考えられるため。</li> </ul> <hr/> <p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>レビー小体型認知症における本剤使用実態下での発現状況を把握するため。</p> <hr/> <p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>血小板減少に関する情報を医療従事者及び患者に対し確実に提供し、適正使用に関する理解を促すため。</p>

重要な潜在的リスク	
過量投与	
	<p>重要な潜在的リスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般に認知症患者では潜在的な誤服用リスクがあるため、医療従事者・家族などの介護者の管理下での投与が必要である。先発医薬品の製造販売後に過量投与の症例が報告されており、発現した場合に重篤な転帰を辿る可能性があることから設定した。</li> </ul>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>通常の医薬品安全性監視活動で情報収集を行う。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「用法・用量に関する使用上の注意」及び「使用上の注意」の「過量投与」の項及び患者向医薬品ガイドに、投与期間中及び当該事象発現時の注意について記載して、適切な管理のもとで投与すること及び当該事象発現時の注意について注意喚起する。</li> <li>・ 追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>適切な管理が必要であること及び過量投与発現時に関する情報提供を医療従事者に対し情報提供を行い、適正使用に関する理解を促すため。</p>
原因不明の突然死	
	<p>重要な潜在的リスクとした理由：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先発医薬品の国内自発報告でも報告がある。発現状況が不明であり、剖検の結果等も得られず、本剤との関連性を特定するための情報が不足しており、本剤との因果関係は明らかではない。以上から潜在的リスクに設定した。</li> </ul>
	<p>医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>・ 追加の安全性監視活動として以下を実施する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> <li>2. 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）</li> </ol> </li> </ul> <p><b>【選択理由】</b></p> <p>自発報告等での情報の収集に努める。特定使用成績調査や自発報告における原因不明の突然死の発現割合の推移についても定期的に確認する。</p>
	<p>リスク最小化活動の内容及びその選択理由：</p> <p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常のリスク最小化活動として、現在の添付文書の「重大な副作用」の項及び患者向医薬品ガイドに記載して、注意喚起する。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材（適正使用ガイド）の提供を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 本剤投与による原因不明の突然死の発現の可能性を医療従事者が理解した上で、適正な使用がなされるよう理解を促すため。</p>
--

重要な不足情報	
長期投与時における安全性（レビー小体型認知症）	
重要な不足情報とした理由：	<ul style="list-style-type: none"> <li>本剤は、長期間使用することが想定される。先発医薬品においても国内におけるレビー小体型認知症を対象とした長期使用時の安全性に関する情報が得られていないことから設定した。</li> </ul>
医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由：	<p><b>【内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通常の医薬品安全性監視活動</li> <li>追加の安全監視活動として、特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）を実施する。</li> </ul> <p><b>【選択理由】</b> 長期使用時の副作用の発現状況を把握するため。</p>
リスク最小化活動の内容及びその選択理由：	<p><b>【内容】</b> なし</p> <p><b>【選択理由】</b> 現状、特記すべき注意喚起内容はなく、新たな情報が得られたら検討することが適切と考えた。</p>

### 1. 2 有効性に関する検討事項

長期投与時における有効性（レビー小体型認知症）	
有効性に関する検討事項とした理由：	<ul style="list-style-type: none"> <li>本剤は、レビー小体型認知症に対して長期間使用されることが想定されるが、開発段階においては長期使用例数が限られていたため、長期使用時の有効性に関する情報をより多く収集する必要があることから設定した。</li> </ul>
有効性に関する調査・試験の名称：	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）</li> </ul>
調査・試験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由：	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定使用成績調査において、安全性に関する評価を行うとともに、有効性に関する情報として認知機能検査（HDR-S又はMMSE）を実施する。</li> </ul>
全般臨床症状に対する有効性（レビー小体型認知症）	
有効性に関する検討事項とした理由：	<ul style="list-style-type: none"> <li>製造販売後に全般臨床症状に対する有効性を示すことが必要と判断したことから設定した。</li> </ul>

	有効性に関する調査・試験の名称： ・ 製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）
	調査・試験の目的、内容及び手法の概要並びに選択理由： ・ 本剤のリスク・ベネフィットをより明確にするため、本剤のレビー小体型認知症における全般臨床症状を検討するための製造販売後臨床試験を実施する。

## 2. 医薬品安全性監視計画の概要

通常 of 医薬品安全性監視活動	
通常 of 医薬品安全性監視活動の概要： 副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検討（及び実行）	
追加 of 医薬品安全性監視活動	
特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）	
	<p><b>【安全性検討事項】</b>          徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT 延長、心室頻脈（torsades de pointer を含む）、心室細動、失神、消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血、消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）、パーキンソン症状、心筋梗塞、心不全、肝炎、肝機能障害、黄疸、脳性発作、脳出血、脳血管障害、悪性症候群、横紋筋融解症、呼吸困難、急性膵炎、急性腎不全、血小板減少、過量投与、原因不明の突然死の発現状況</p> <p><b>【目的】</b>          レビー小体型認知症患者に対するドネペジル塩酸塩の使用実態下での 52 週投与における以下の事項を把握する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 未知の副作用</li> <li>(2) 副作用の発現状況</li> <li>(3) 安全性又は有効性に影響を与えると考えられる要因</li> <li>(4) パーキンソン症状の発現状況</li> <li>(5) 適正使用状況（適格な診断、投与及び認知機能検査実施状況等）</li> </ol> <p><b>【実施計画案】</b>          調査期間：検討中          目標症例数：500 例          実施方法：中央登録方式にて実施する。観察期間は 52 週間。          重点調査項目：パーキンソン症状の発現状況          有効性評価項目：認知機能検査（HDR-S 又は MMSE）</p> <p><b>【実施計画の根拠】</b>          アルツハイマー型認知症における徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT 延長、心室頻脈（torsades de pointer を含む）、心室細動、失神、消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血、消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）、心筋梗塞、心不</p>

	<p>全、肝炎、肝機能障害、黄疸、脳性発作、脳出血、脳血管障害、悪性症候群、横紋筋融解症、呼吸困難、急性膵炎、急性腎不全、血小板減少、過量投与及び原因不明の突然死の発現状況は、これまでに実施した製造販売後調査等で把握できているが、レビー小体型認知症においては、十分な検討ができていない。また、レビー小体型認知症に対する本剤の長期投与において、本剤投与前におけるパーキンソン症状が比較的強いと考えられる集団においてパーキンソン症状の有害事象の発現率が高まる傾向が示されたが、詳細なリスク要因については、十分な検討ができていない。</p> <p>これらの検討を行うとともに、レビー小体型認知症の診断状況、投与継続の要否に関する判断が適切になされているかを確認する必要がある。現在情報が限られている長期投与時におけるこれらの情報を使用実態下においてより多く収集する。</p> <p><b>【節目となる予定の時期及び根拠】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討中</li> </ul> <p><b>【当該医薬品安全性監視活動の結果に基づいて実施される可能性のある追加の措置及びその開始の決定基準】</b></p> <p>節目となる時期に、以下の内容を含めた、医薬品リスク管理計画書の見直しを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT延長、心室頻脈（torsades de pointerを含む）、心室細動、失神、消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血、消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）、パーキンソン症状、心筋梗塞、心不全、肝炎、肝機能障害、黄疸、脳性発作、脳出血、脳血管障害、悪性症候群、横紋筋融解症、呼吸困難、急性膵炎、急性腎不全、血小板減少、過量投与及び原因不明の突然死について、リスク要因が明確になった場合には、資材（適正使用ガイド等）の改訂要否を検討する。</li> <li>・ 新たな安全性検討事項の有無も含めて、本調査の計画内容の変更要否について検討を行う。</li> <li>・ 新たな安全性検討事項に対する、リスク最小化策の策定要否について検討を行う。</li> </ul>
	製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）
	3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要の項の製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）を参照

3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要

特性使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）	
	2. 医薬品安全性監視計画の概要の項の特定使用成績調査（レビー小体型認知症・長期使用）を参照
製造販売後臨床試験（レビー小体型認知症）	
	検討中

#### 4. リスク最小化計画の概要

通常のリスク最小化活動	
通常のリスク最小化活動の概要： 添付文書及び患者向医薬品ガイドによる情報提供	
追加のリスク最小化活動	
医療従事者向け資材（適正使用ガイド、情報提供資材（診断基準））の提供	
	<p><b>【安全性検討事項】</b> 徐脈、心ブロック、洞不全症候群、洞停止、QT 延長、心室頻拍（torsades de pointes を含む）、心室細動、失神、消化性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔、消化管出血、消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）、パーキンソン症状、心筋梗塞、心不全、肝炎、肝機能障害、黄疸、脳性発作、脳出血、脳血管障害、悪性症候群、横紋筋融解症、呼吸困難、急性膵炎、急性腎不全、血小板減少、過量投与、原因不明の突然死</p> <p><b>【目的】</b> 上記の安全性検討事項に関する注意喚起及び適切な診断・治療のための本剤の使用方法に関する包括的な情報を提供する。また、レビー小体型認知症の診断基準に関する情報を提供する。</p> <p><b>【具体的な方法】</b> 承認後に MR が提供、説明し、資材の活用を依頼する。</p> <p><b>【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】</b> 副作用の発現傾向に変化が認められ、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合、または新たな安全性検討事項が認められた場合には、資材の改訂、提供方法等の実施方法の改訂、追加資材の作成などを検討する。</p>
患者及び患者の家族向けパンフレットの作成と提供	
	<p><b>【安全性検討事項】</b> 消化器症状（食欲減退、悪心、嘔吐、下痢等）、パーキンソン症状</p> <p><b>【目的】</b> 本剤による副作用の早期発見につながる自覚症状について、患者及び家族などの介護者の確実な理解を促すため。</p> <p><b>【具体的な方法】</b> 承認後に MR が提供、説明し、資材の活用を依頼する。</p> <p><b>【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】</b> 副作用の発現傾向に変化が認められ、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合、または新たな安全性検討事項が認められた場合には資材の改訂、実施方法の改訂、追加の資材作成などを検討する。</p>



5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧

5. 1 医薬品安全性監視計画の一覧

通常の医薬品安全性監視活動				
自発報告、文献・学会情報、外国措置報告より報告される有害事象症例の評価。				
追加の医薬品安全性監視活動				
追加の医薬品安全性監視活動の名称	節目となる症例数 ／目標症例数	節目となる 予定の時期	実施状況	報告書の 作成予定日
特定使用成績調査 (レビー小体型認知症・ 長期使用)	500 例	検討中	検討中	検討中
製造販売後臨床試験 (レ ビー小体型認知症)	検討中	検討中	検討中	検討中

5. 2 有効性に関する調査・試験の計画の一覧

有効性に関する調査・試験の名称	節目となる症例数 ／目標症例数	節目となる 予定の時期	実施状況	報告書の 作成予定日
特定使用成績調査 (レビー小体型認知症・ 長期使用)	500 例	検討中	検討中	検討中
製造販売後臨床試験 (レ ビー小体型認知症)	検討中	検討中	検討中	検討中

5. 3 リスク最小化計画の一覧

通常のリスク最小化活動		
添付文書を作成し、必要に応じて改訂するとともに医療従事者に提供する。 患者向医薬品ガイドを作成し、必要に応じて改訂するとともに医療従事者に提供する。		
追加のリスク最小化活動		
追加のリスク最小化活動の名称	節目となる予定の時期	実施状況
医療従事者向け適正使用ガイド、 情報提供資材 (診断基準) の作 成・改訂・提供	・副作用の発現傾向に変化が認められた場 合。	検討中
患者及び患者の家族向けパンフ レットの作成・改訂・提供	・副作用の発現傾向に変化が認められた場 合。	検討中